

■■化学療法投与計画書《S-1+DTX療法》■■

実施日	
-----	--

患者番号	性別	身長	cm	
カナ氏名	生年月日	体重	kg	指示医
患者氏名	年齢	体表面積	m <sup>2</sup>	

Rp) ドセタキセル(ワンタキソテール)      40 mg/m<sup>2</sup>      day1      3週毎  
 TS-1      ※用量は下記参照      内服      day1~14

本管①
生理食塩液 100mL      1      瓶

レジメンコメント1
レジメンコメント2

側管①
15分 ↓
パロノセトロン点滴静注      1      袋
バッグ0.75mg 50mL
デカドロン注射液1.65mg 0.5mL      2      管
※2回目以降(過敏症状発現ない時)
デカドロン注2管へ減量可

※TS-1用量: 体表面積に応じて調整  
 <1.25m<sup>2</sup>      80mg/body /日(20mg 4C 2×)  
 1.25~1.5m<sup>2</sup>      100mg/body /日(25mg 4C 2×)  
 1.5m<sup>2</sup><      120mg/body /日(20mg 6C 2×)

側管②
60分 ↓
大塚糖液5% 250mL      1      袋
ドセタキセル      mg
ドセタキセル点滴静注80mg
ドセタキセル点滴静注20mg

<実施時の注意>

漏出時: 漏出時は直ちに投与を中止し、ステロイドの局注、ステロイドの外用剤で対処する。  
 調製する際は21G針が推奨される(19G以上の太い注射針を使用した場合にゴム栓のコアリングの報告あり)

<注意すべき副作用>

- 食欲不振、吐き気    ●口内炎    ●手足のしびれ    ●脱毛(頭髪、まつ毛、眉毛など)    ●白血球減少
- 赤血球減少(貧血)    ●血小板減少    ●肝機能低下    ●手や足のむくみ    ●爪の変化