

■■ 化学療法投与計画書《S-1+HER療法》■■

実施日	
-----	--

患者番号	性別	身長	cm	指示医
カナ氏名	生年月日	体重	kg	
患者氏名	年齢	体表面積	m ²	

Rp) トラスツズマブ(ハーセプチン) [初回] 8mg/kg [2回目以降] 6mg/kg day1 3週
毎

本管①
生理食塩液 100mL 1 瓶

レジメンコメント1
レジメンコメント2

側管①
大塚生食注 250mL 1 袋
トラスツズマブ mg
※ トラスツズマブ点滴静注用150mg 150mg:
トラスツズマブ点滴静注用60mg 60mg:

※初回は90分 忍容性良好時2回目以降30分まで短縮可

★トラスツズマブ投与期間中、以下の初期症状
(Infusion reaction)に注意すること

- ・発熱、悪寒
- ・嘔気、嘔吐
- ・疼痛・頭痛・嘔気嘔吐・めまい・咳・発疹・無力症
など
- ・アナフィラキシー様症状
- ・間質性肺炎・肺障害

※TS-1用量：体表面積に応じて調整

<1.25m ²	80mg/body /日 (20mg 4C 2×)
1.25~1.5m ²	100mg/body /日 (25mg 4C 2×)
1.5m ² <	120mg/body /日 (20mg 6C 2×)

<実施時の注意>

ブドウ糖溶液との混合を避け、本剤とブドウ糖溶液の同じ点滴ラインを用いた同時投与は行わないこと。

<注意すべき副作用>

- アレルギー様症状 ●心機能低下 ●食欲不振、吐き気 ●皮疹 ●下痢 ●口内炎 ●色素沈着
- 白血球減少 ●赤血球減少(貧血) ●血症板減少