

■■化学療法投与計画書《TC療法》■■

実施日	
-----	--

患者番号	性別	身長	cm	指示医
カナ氏名	生年月日	体重	kg	
患者氏名	年齢	体表面積	m ²	

Rp) ドセタキセル(ワンタキソテール) 70 mg/m² day1
 シクロホスファミド(エンドキサン) 600 mg/m² day1

3週毎

本管①	生理食塩液 100mL 1 瓶

レジメンコメント1
レジメンコメント2

側管①	生理食塩液開始時15分かけて	
15分	パロノセトロン点滴静注	1 袋
	バッグ0.75mg 50mL	
	デカドロン注射液1.65m	4 管

アプレピタント125mg1カプセル服用
 (シクロホスファミド投与開始1~1.5時間前)

- アプレピタントカプセル
Day1 125mg
(シクロホスファミド投与開始1~1.5時間前に服用)
- デカドロン錠4mg
Day2,3,4 2錠(8mg)2×/day

側管②	大塚生食注 250mL 1 袋	
60分	ドセタキセル	mg
	ドセタキセル点滴静注80mg	
	ドセタキセル点滴静注20mg	

側管③	※シクロホスファミド100mgあたり 大塚生食注5mLで溶解後に希釈すること	
30分	大塚生食注 250mL 1 袋	
	シクロホスファミド水和物	mg
	注射用エンドキサン500mg:	
	注射用エンドキサン100mg:	

<実施時の注意点>
 漏出時:直ちに投与を中止し、薬剤を吸引、洗浄し、ステロイドの局注、ステロイドの外用剤で対処する。
 ドセタキセル:調製する際は21G針が推奨される(19G以上の太い注射針を使用した場合にゴム栓のコアリングの報告あり)

<注意すべき副作用>
 ●食欲不振、吐き気 ●出血性膀胱炎(血尿、排尿痛) ●口内炎 ●手足のしびれ ●色素沈着
 ●脱毛(頭髪、まつ毛、眉毛など) ●白血球減少 ●赤血球減少(貧血) ●血小板減少
 ●肝機能低下 ●手や足のむくみ ●爪の変化