

患者番号	性別	身長	cm	指示医
カナ氏名	生年月日	体重	kg	
患者氏名	年齢	体表面積	m ²	

Rp) ビノレルビン(ナベルビン) 25 mg/m² day 1,8
シスプラチニ(ランダ) 80 mg/m² day 1

4週毎

アプレピタント80mg1カプセル内服

本管① Day3

120 分	大塚生食注 500mL 1 袋

レジメンコメント1

レジメンコメント2

本管②

120 分	大塚生食注 500mL 1 袋

Day4へ続く

●アプレピタントカプセル

Day2 125mg

(シスプラチニ投与開始1~1.5時間前)

Day3,4 80mg

<実施時の注意点>

漏出時:直ちに投与を中止し、薬剤を吸引、洗浄し、ステロイドの局注、ステロイドの外用剤で対処する。
ビノレルビン:血管痛、静脈炎を起こすことがあるので、注射部位、注射方法等に十分注意し、投与後は補液等

により薬液を十分洗い流すこと。

シスプラチニ:アルミニウムを含む医療器具を用いないこと。

光により分解するので直射日光を避けること。点滴時間が長時間に及ぶ場合には遮光して投与すること。

投与当日は1日3000mL以上の尿量を確保。投与後3日間は1日1500mL以上の尿量を確保する

<用量規制因子>

投与前の白血球数が2000/mm³未満であった場合には投与を延期し、2000/mm³以上に回復するのを待って投与する。

<注意すべき副作用>

- 食欲不振、吐き気
- 血管痛、静脈炎
- 口内炎
- 脱毛(頭髪、まつ毛、眉毛など)
- 手足のしびれ
- 白血球減少
- 赤血球減少(貧血)
- 血小板減少
- 腎機能低下