

■■化学療法投与計画書《VNR療法》■■

実施日	
-----	--

患者番号	性別	身長	cm	
カナ氏名	生年月日	体重	kg	指示医
患者氏名	年齢	体表面積	m ²	

Rp)ビノレルビン(ナベルビン) 25mg/m² day1,8 3週毎(2投1休)

本管①	Day1
大塚生食注	250mL 1 袋

レジメンコメント1
レジメンコメント2

ビノレルビン投与終了後血管内の薬液を十分に
洗い流すため大塚生食注を20分で滴下

側管①	ルート確保後5分かけて投与
生理食塩液	100mL 1 瓶
ビノレルビン酒石酸塩	mg
ナベルビン注40	40mg4mL:
ナベルビン注10	10mg1mL:

5分

Day8へ続く

<実施時の注意>

漏出時:直ちに投与を中止し、薬剤を吸引、洗浄し、ステロイドの局注、ステロイドの外用剤で対処する。
血管痛、静脈炎を起こすことがあるので、注射部位、注射方法等に十分注意し、投与後は補液等により薬液を十分洗い流すこと。必要に応じてステロイド、NSAIDsの投与を考慮する。

<用量規制因子>

投与前の白血球数が2000/mm³未満であった場合には投与を延期し、2000/mm³以上に回復するのを待って投与する。

<注意すべき副作用>

- 食欲不振、吐き気 ●血管痛、静脈炎 ●口内炎 ●脱毛(頭髪、まつ毛、眉毛など) ●白血球減少
- 赤血球減少(貧血) ●肝機能低下