

化学療法投与計画書《VNR療法》

実施日	
-----	--

患者番号	性別	身長	cm	
カナ氏名	生年月日	体重	kg	指示医
患者氏名	年齢	体表面積	m ²	

Rp)ビノレルビン(ナベルビン) 25mg/m² day1,8 3週毎(2投1休)

本管①	Day8
大塚生食注	250mL 1 袋

レジメンコメント1
レジメンコメント2

ビノレルビン投与終了後血管内の薬液を十分に洗い流すため大塚生食注を20分で滴下

側管①	ルート確保後5分かけて投与
生理食塩液	100mL 1 瓶
ビノレルビン酒石酸塩	mg
ナベルビン注40	40mg4mL:
ナベルビン注10	10mg1mL:



<実施時の注意>

漏出時:直ちに投与を中止し、薬剤を吸引、洗浄し、ステロイドの局注、ステロイドの外用剤で対処する。
血管痛、静脈炎を起こすことがあるので、注射部位、注射方法等に十分注意し、投与後は補液等により薬液を十分洗い流すこと。必要に応じてステロイド、NSAIDsの投与を考慮する。

<用量規制因子>

投与前の白血球数が2000/mm³未満であった場合には投与を延期し、2000/mm³以上に回復するのを待って投与する。

<注意すべき副作用>

- 食欲不振、吐き気 ●血管痛、静脈炎 ●口内炎 ●脱毛(頭髪、まつ毛、眉毛など) ●白血球減少
- 赤血球減少(貧血) ●肝機能低下