

実施日	
-----	--

患者番号	性別	身長	cm	
カナ氏名	生年月日	体重	kg	指示医
患者氏名	年齢	体表面積	m ²	

Rp) トラスツズマブ(ハーセプチン) [初回] 4mg/kg [2回目以降] 2mg/kg day1 毎週

本管①
生理食塩液 100mL 1 瓶

レジメンコメント1
レジメンコメント2

側管①
大塚生食注 250mL 1 袋
トラスツズマブ mg
トラスツズマブ点滴静注用150mg 150mg:
トラスツズマブ点滴静注用60mg 60mg:

<注意すべき副作用>
 ●アレルギー様症状 ●心機能低下

※初回は90分 忍容性良好時2回目以降30分まで短縮可

★トラスツズマブ投与期間中、以下の初期症状 (Infusion reaction)に注意すること

- ・発熱、悪寒
- ・嘔気、嘔吐
- ・疼痛・頭痛・嘔気嘔吐・めまい・咳・発疹・無力症など
- ・アナフィラキシー様症状
- ・間質性肺炎・肺障害

<実施時の注意>

ブドウ糖溶液との混合を避け、本剤とブドウ糖溶液の同じ点滴ラインを用いた同時投与は行わないこと。

<用量規制因子>

投与予定日より1週間以内の遅れの場合は2mg/kgを投与する。
 投与予定日より1週間を超えた場合は改めて初回投与量(4mg/kg)で投与する。なお、次回以降は2mg/kgを1週間間隔で投与する。