

■■化学療法投与計画書《CBDCA療法》■■

実施日	
-----	--

患者番号	性別	身長	cm	
カナ氏名	生年月日	体重	kg	指示医
患者氏名	年齢	体表面積	m <sup>2</sup>	

Rp)カルボプラチン(パラプラチン)                      300mg/m<sup>2</sup>                      day1                      4週毎

<b>本管①</b>
生理食塩液100mL      1      瓶

レジメンコメント1
レジメンコメント2

<b>側管①</b>		
アロキシ点滴静注バッグ	1	袋
0.75mg 50mL		
デカドロン注射液1.65mg 0.5mL	2	管

<b>側管②</b>	<b>溶解後遮光</b>
大塚生食注 250mL	1 袋
カルボプラチン	mg
パラプラチン注射液450mg 45mL:	
パラプラチン注射液150mg 15mL:	



**<実施時の注意>**

漏出時:直ちに中止し、薬剤を吸引、洗浄し、ステロイドの局注、ステロイドの外用剤で対処する。  
 アルミニウムと反応して沈殿物を形成し、活性が低下するので、使用にあたってはアルミニウムを含む医療器具を用いないこと。  
 投与を重ねるとショック、アナフィラキシーの発現頻度が高くなる傾向がみられる。

**<注意すべき副作用>**

●食欲不振、吐き気 ●白血球減少 ●赤血球減少(貧血) ●血小板減少