

実施日	
-----	--

患者番号	性別	身長	cm	指示医
カナ氏名	生年月日	体重	kg	
患者氏名	年齢	体表面積	m ²	

Rp)パクリタキセル(タキソール) 80 mg/m² 点滴静注 day 1,8,15 4週毎
(3週投与1週休薬)

パクリタキセル投与30分前にレスタミン錠10mg5錠(50mg)内服

本管①	Day15
生理食塩液	100mL 1 瓶

レジメンコメント1
レジメンコメント2

側管①	生理食塩液開始時5分かけて
5分	【50mL】生理食塩液 50mL 1 瓶
	ファモチジン注射用20mg「日医工」 1 瓶
	デカドロン注射液1.65m 2 管

2回目以降(過敏症状発現ないとき)デカドロン注射液2管へ減量可

側管②	
15分	パロノセトロン点滴静注
	バッグ0.75mg 50mL 1 袋

側管③	インラインフィルター使用
60分	大塚生食注 250mL 1 袋
	パクリタキセル mg
	タキソール注射液100mg 16.7mL:
	タキソール注射液30mg 5mL:

<実施時の注意>

漏出時:直ちに投与を中止し薬剤を吸引、洗浄し、ステロイドの局注、ステロイドの外用剤で対処する。
0.22ミクロン以下のメンブレンフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与。
点滴用セット等で本剤の溶解液が接触する部分に、可塑剤としてDEHPを含有しているものの使用を避けること。
溶剤として無水エタノールを含有するため、投与前に問診により適切かどうか判断すること。

<注意すべき副作用>

- 過敏症 ●食欲不振、吐き気 ●筋肉痛、関節痛 ●口内炎 ●手足のしびれ ●脱毛(頭髪、まつ毛、眉毛など)
- 白血球減少 ●赤血球減少(貧血) ●血小板減少 ●肝機能低下