

実施日	
-----	--

患者番号	性別	身長	cm	
カナ氏名	生年月日	体重	kg	指示医
患者氏名	年齢	体表面積	m <sup>2</sup>	

Rp)パクリタキセル(タキソール) 80mg/m<sup>2</sup> day1 毎週

<b>本管①</b>	生理食塩液 100mL	1	瓶

レジメンコメント1
レジメンコメント2

<b>側管①</b>				
1 5	【50mL】生理食塩液 50mL	1	瓶	
	ファモチジン注射用20mg「日医工」	1	瓶	
	デカドロン注射液1.65m	4	管	

<b>側管②</b>			
1 5	【50mL】生理食塩液 50mL	1	瓶
	パラミン注5mg 0.5%1mL	2	管

<b>側管③</b>	<b>インラインフィルター使用</b>		
6 0	大塚糖液5% 250mL	1	袋
	パクリタキセル		mg
	タキソール注射液100mg	16.7mL:	
	タキソール注射液30mg	5mL:	

パクリタキセル終了後15分フラッシュ

<実施時の注意>

漏出時:直ちに投与を中止し薬剤を吸引、洗浄し、ステロイドの局注、ステロイドの外用剤で対処する。  
0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与。  
点滴用セット等で本剤の溶解液が接触する部分に、可塑剤としてDEHPを含有しているものの使用を避けること。  
溶剤として無水エタノールを含有するため、投与前に問診により適切かどうか判断すること。

<注意すべき副作用>

- 過敏症 ●食欲不振、吐き気 ●筋肉痛、関節痛 ●口内炎 ●手足のしびれ ●脱毛(頭髪、まつ毛、眉毛など)
- 白血球減少 ●赤血球減少(貧血) ●血小板減少 ●肝機能低下