

患者番号	性別	身長	cm	
カナ氏名	生年月日	体重	kg	指示医
患者氏名	年齢	体表面積	m <sup>2</sup>	

Rp)オキサリプラチン 130mg/m<sup>2</sup> 点滴静注 Day1  
 トラスツズマブ [初回] 8mg/kg  
 [2回目以降] 6mg/kg Day1  
 ゼローダ ※用量は下記参照 内服(1日2回) Day1(夕)~15

※ゼローダ用量:体表面積に応じて調整 [1日2回服用]  
 1.36m<sup>2</sup>未満 1,200mg(4T)/body /回  
 1.36m<sup>2</sup>以上1.66m<sup>2</sup>未満 1,500mg(5T)/body /回  
 1.66m<sup>2</sup>以上1.96m<sup>2</sup>未満 1,800mg(6T)/body /回

レジメンコメント1
レジメンコメント2

本管①	生理食塩液 100mL	1	瓶
-----	-------------	---	---

Day2~4  
 デカドロン錠4mg 2錠(8mg) 2× 3日間内

側管①	パロセトロン点滴静注	1	袋
15分	バッグ0.75		
	デカドロン注射液1.65m	4	管

<注意すべき副作用>  
 ●過敏症 ●食欲不振、吐き気  
 ●手足のしびれ ●口内炎 ●下痢  
 ●色素沈着 ●脱毛(頭髪、まつ毛、眉毛など)  
 ●白血球減少 ●赤血球減少(貧血)  
 ●血小板減少 ●肝機能低下  
 ●アレルギー様症状 ●心機能低下  
 ●手足症候群

側管②	大塚生食注 250mL	1	袋
※	トラスツズマブ		mg
	〈腫〉トラスツズマブBS点滴静注用150		
	〈腫〉トラスツズマブBS点滴静注用60		

※初回90分 忍容性良好時:2回目以降30分まで短縮可

側管③	大塚糖液5% 250mL(5%TZ)	1	袋
120分	オキサリプラチン		mg
	〈腫〉オキサリプラチン点滴静注液100		
	〈腫〉オキサリプラチン点滴静注液50		

★トラスツズマブ投与期間中、以下の初期症状 (Infusion reaction)に注意すること  
 ・発熱、悪寒  
 ・嘔気、嘔吐  
 ・疼痛・頭痛・めまい・咳・発疹・無力症など  
 ・アナフィラキシー様症状

生理食塩液でルート確保し終了時50mL程度フラッシュ

<実施時の注意点>

漏出時:直ちに投与を中止し、薬剤を吸引、洗浄し、ステロイドの局注、ステロイドの外用剤で対処する。  
 ●トラスツズマブ  
 ブドウ糖溶液との混合を避け、本剤とブドウ糖溶液の同じ点滴ラインを用いた同時投与は行わないこと。  
 ●オキサリプラチン  
 アルミニウムとの接触により分解するため、アルミニウムが用いられている機器は使用しないこと。  
 本剤投与後数分以内の過敏症状(気管支痙攣、呼吸困難、血圧低下等)が認められた場合には、直ちに投与を中止し適切な処置を行うこと。また回復後は本剤を再投与しないこと。