

■■化学療法投与計画書《変法M-VAC療法》■■

実施日	
-----	--

患者番号	性別	身長	cm	指示医
カナ氏名	生年月日	体重	kg	
患者氏名	年齢	体表面積	m ²	

Rp) メトトレキサート(メソトレキセート) 30mg/m² day1,15,22
 ビンブラスチン(エクザール) 3mg/m² day2,15,22
 ピラルビシン(ピノルビン) 30mg/m² day2
 シスプラチン(ランダ) 70mg/m² day2 4週毎

本管①	Day22		
	ラクテック注	500mL	1 瓶
	大塚糖液50%	20mL	1 管
	メイロン静注7%	20mL	1 管

レジメンコメント1
レジメンコメント2

※100mL/時間

側管①	生理食塩液	100mL	1 瓶
30分	メトトレキサート		mg
	注射用メソトレキセート	5mg:	

●アプレピタントカプセル
 Day2 125mg
 (シスプラチン投与開始1~1.5時間前)
 Day3,4 80mg
 ●デカドロン錠4mg
 Day3,4,5 2錠(8mg)2×/Day

静注	生食に1mg/mLの濃度で溶解	
	(mL)生理食塩液	20mL mL
	ビンブラスチン硫酸塩	mg
	エクザール注射用10mg:	

<実施時の注意>

漏出時:直ちに投与を中止し、薬剤を吸引、洗浄し、ステロイドの局注、ステロイドの外用剤で対処する。

●ピラルビシン

本剤の尿中排泄により尿が赤色になることがある。

●シスプラチン

アルミニウムと反応して沈殿物を形成し、活性が低下するので、使用にあたってアルミニウムを含む医療用器具を用いないこと。本剤は光により分解するので直射日光を避け、点滴時間が長時間に及ぶ場合には遮光して投与すること。

<注意すべき副作用>

- 食欲不振、吐き気 ●口内炎 ●下痢 ●発熱 ●脱毛(頭髪、まつ毛、眉毛など) ●手足のしびれ
- 白血球減少 ●赤血球減少(貧血) ●血小板減少 ●腎機能低下 ●肝機能低下 ●心機能低下