

化学療法投与計画書《ddEC療法》

実施日	
-----	--

患者番号	性別	身長	cm	指示医
カナ氏名	生年月日	体重	kg	
患者氏名	年齢	体表面積	m ²	

Rp) エピルビシン 90 mg/m² day1
 シクロホスファミド(エンドキサン) 600 mg/m² day1 2週毎

アプレピタント125mg1カプセル
 エピルビシン投与開始1～1.5時間前内服

レジメンコメント1
レジメンコメント2

本管①

生理食塩液	100mL	1	瓶
-------	-------	---	---

側管①

15分 ↓

パロノセトロン点滴静注	1	袋
バッグ0.75		
デカドロン注射液1.65m	6	管

側管② 全量100mLに調製

15分 ↓

【mL】生理食塩液	100mL	mL
エピルビシン		mg
<腫>エピルビシン塩酸塩注射液50mg:		
<腫>エピルビシン塩酸塩注射液10mg:		

側管③

30分 ↓

生理食塩液	100mL	1	瓶
シクロホスファミド水和物			mg
<腫>注射用エンドキサン500mg:			
<腫>注射用エンドキサン100mg:			

● 内服
 アプレピタントカプセル
 day1 125mg
 (エピルビシン投与開始1～1.5時間前)
 day2,3 80mg
 デカドロン錠4mg
 day2,3,4 2錠(8mg) 2×/day

※シクロホスファミド終了後 生食50mLフラッシュ 終了までルートキープ

<実施時の注意>
 漏出時:直ちに投与を中止し、薬剤を吸引、洗浄し、ステロイドの局注、ステロイドの外用剤で対処する。
 ●エピルビシン
 本剤の尿中排泄により尿が赤色になることがある。
 コアリングが発生する可能性が高くなるため21G又はそれより細い針を使用する。(ケモセーフ使用時は不要)

<注意すべき副作用>
 ●食欲不振、吐き気 ●出血性膀胱炎(血尿、排尿痛) ●口内炎 ●色素沈着
 ●脱毛(頭髪、まつ毛、眉毛など) ●白血球減少 ●赤血球減少(貧血)
 ●血小板減少 ●心機能低下