

■■化学療法投与計画書《ddPTX療法》■■

実施日	
-----	--

患者番号	性別	身長	cm	
カナ氏名	生年月日	体重	kg	指示医
患者氏名	年齢	体表面積	m <sup>2</sup>	

Rp) パクリタキセル(タキソール)      175mg/m<sup>2</sup>      day1      2週毎

<b>本管①</b>
生理食塩液 100mL      1      瓶

レジメンコメント1
レジメンコメント2

<b>側管①</b>	
1 5 分	【50mL】生理食塩液 50      1      瓶
	ファモチジン静注20mg      1      管
	デカドロン注射液1.65m      8      管
	ポララミン注5mg      1      管

<b>側管②</b>	<b>インラインフィルター使用</b>
18 0	大塚生食注 500mL袋      1      袋
	パクリタキセル(タキソール)      mg
	〈腫〉タキソール注射液100mg:
	〈腫〉タキソール注射液30mg:

パクリタキセル終了後15分フラッシュ

<実施時の注意>

漏出時:直ちに投与を中止し薬剤を吸引、洗浄し、ステロイドの局注、ステロイドの外用剤で対処する。  
0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与。  
点滴用セット等で本剤の溶解液が接触する部分に、可塑剤としてDEHPを含有しているものの使用を避けること。  
溶剤として無水エタノールを含有するため、投与前に問診により適切かどうか判断すること。

<注意すべき副作用>

- 過敏症   ●食欲不振、吐き気   ●筋肉痛、関節痛   ●口内炎   ●手足のしびれ   ●脱毛(頭髪、まつ毛、眉毛など)
- 白血球減少   ●赤血球減少(貧血)   ●血小板減少   ●肝機能低下