

■■化学療法投与計画書《FEC100療法》■■

実施日	
-----	--

患者番号	性別	身長	cm	
カナ氏名	生年月日	体重	kg	指示医
患者氏名	年齢	体表面積	m ²	

Rp) エピルビシン(ファルモルビシン) 100 mg/m² day1
 シクロホスファミド(エンドキサン) 500 mg/m² day1
 フルオロウラシル(5-FU) 500 mg/m² day1 3週

アプレピタント125mg1カプセル エピルビシン投与1~1.5時間前内服

本管①	側管① 生理食塩液開始時15分かけて
生理食塩液 100mL 1 瓶	パロノセトロン点滴静注 1 袋 バッグ0.75mg 50mL デカドロン注射液1.65mg 0.5mL 6 管

側管②	【50mL】生理食塩液 50mL 1 瓶 エピルビシン mg ファルモルビシン注射用50mg: ファルモルビシン注射用10mg:
------------	---

レジメンコメント1
レジメンコメント2

側管③	生理食塩液 100mL 1 瓶 シクロホスファミド水和物 mg 注射用エンドキサン500mg: 注射用エンドキサン100mg:
------------	--

● 内服
 アプレピタントカプセル
 day1 125mg
 (エピルビシン投与開始1~1.5時間前)
 day2,3 80mg
 デカドロン錠4mg
 day2,3,4 2錠(8mg) 2x /day

側管④	【50mL】生理食塩液 50mL 1 瓶 フルオロウラシル mg 5-FU注1000mg: 5-FU注250協和 250mg:
------------	--

※フルオロウラシル終了後50mLフラッシュ 終了までルートキープ

＜実施時の注意＞

漏出時:直ちに投与を中止し、薬剤を吸引、洗浄し、ステロイドの局注、ステロイドの外用剤で対処する。

●エピルビシン
 本剤の尿中排泄により尿が赤色になることがある。
 コアリングが発生する可能性が高くなるため21G又はそれより細い針を使用する。(ケモセーフ使用時は不要)

●フルオロウラシル
 TS-1投与中もしくは投与中止後7日以内→投与不可

＜注意すべき副作用＞

●食欲不振、吐き気 ●出血性膀胱炎(血尿、排尿痛) ●口内炎 ●色素沈着 ●脱毛(頭髪、まつ毛、眉毛など)
 ●白血球減少 ●赤血球減少(貧血) ●血小板減少 ●心機能低下