

化学療法投与計画書《FEC療法》

実施日	
-----	--

患者番号	性別	身長	cm	
カナ氏名	生年月日	体重	kg	指示医
患者氏名	年齢	体表面積	m ²	

Rp) エピルビシン(ファルモルビシン) 80 mg/m² day1
 シクロホスファミド(エンドキサン) 500 mg/m² day1
 フルオロウラシル(5-FU) 500 mg/m² day1 3週毎

アプレピタント125mg1カプセル エピルビシン投与1~1.5時間前内服

本管①	側管①	生理食塩液開始時15分かけて
生理食塩液 100mL 1 瓶	15分	パロプロセトロン点滴静注
		バッグ0.75mg 50mL 1 袋
		デカドロン注射液1.65mg 0.5mL 6 管

側管②	30分
生理食塩液 100mL 1 瓶	
エピルビシン mg	
ファルモルビシン注射用50mg:	
ファルモルビシン注射用10mg:	

レジメンコメント1
レジメンコメント2

側管③	30分
生理食塩液 100mL 1 瓶	
シクロホスファミド水和物 mg	
注射用エンドキサン500mg:	
注射用エンドキサン100mg:	

●内服
 アプレピタントカプセル
 day1 125mg
 (エピルビシン投与開始1~1.5時間前)
 day2,3 80mg
 デカドロン錠4mg
 day2,3,4 2錠(8mg) 2×/day

側管④	5分
生理食塩液 100mL 1 瓶	
フルオロウラシル mg	
5-FU注1000mg:	
5-FU注250協和 250mg:	

※フルオロウラシル終了後50mLフラッシュ 終了までルートキープ

<実施時の注意>

漏出時:直ちに投与を中止し、薬剤を吸引、洗浄し、ステロイドの局注、ステロイドの外用剤で対処する。
 ●エピルビシン
 本剤の尿中排泄により尿が赤色になることがある。
 コアリングが発生する可能性が高くなるため21G又はそれより細い針を使用する。(ケモセーフ使用時は不要)
 ●フルオロウラシル

<注意すべき副作用>

- 食欲不振、吐き気 ●出血性膀胱炎(血尿、排尿痛) ●口内炎 ●色素沈着 ●脱毛(頭髪、まつ毛、眉毛など)
- 白血球減少 ●赤血球減少(貧血) ●血小板減少 ●心機能低下