

■■化学療法投与計画書《GC療法》■■

実施日	
-----	--

患者番号	性別	身長	cm	
カナ氏名	生年月日	体重	kg	指示医
患者氏名	年齢	体表面積	m ²	

Rp) ゲムシタビン(ジェムザール) 100 mg/m² day1,8,15
 シスプラチン(ランダ) 70 mg/m² day2

本管①	Day1
KN3号輸液	500mL 1 袋

レジメンコメント1
レジメンコメント2

側管①	KN3号開始時30分かけて
↓ 30分 ↓	生理食塩液 100mL 1 瓶 デカドロン注射液1.65mg 0.5mL 2 管

側管②	全量100mLに調製
↓ 30分 ↓	生理食塩液 100mL mL ゲムシタビン塩酸塩 mg ゲムシタビン点滴静注液1g ゲムシタビン点滴静注液200mg

- アプレピタントカプセル
Day2 125mg
(シスプラチン投与開始1~1.5時間前)
- Day3,4 80mg
- デカドロン錠4mg
Day3,4,5 2錠(8mg) 2×/Day

180分
Day2へ続く

<実施時の注意>

漏出時:直ちに投与を中止し、薬剤を吸引、洗浄し、ステロイドの局注、ステロイドの外用剤で対処する。

●シスプラチン

アルミニウムと反応して沈殿物を形成し、活性が低下するのでアルミニウムを含む医療用器具を用いないこと。
 光により分解するので直射日光を避けること。点滴時間が長時間に及ぶ場合には遮光して投与すること。

<注意すべき副作用>

- 発熱 ●食欲不振、吐き気 ●血管痛、静脈炎 ●口内炎 ●脱毛(頭髪、まつ毛、眉毛など) ●手足のしびれ
- 白血球減少 ●赤血球減少(貧血) ●血小板減少 ●腎機能低下 ●肝機能低下