

■■化学療法投与計画書《GC療法》■■

| | |
|-----|--|
| 実施日 | |
|-----|--|

| | | | | |
|------|------|------|----------------|-----|
| 患者番号 | 性別 | 身長 | cm | |
| カナ氏名 | 生年月日 | 体重 | kg | 指示医 |
| 患者氏名 | 年齢 | 体表面積 | m ² | |

Rp) ゲムシタビン(ジェムザール) 100 mg/m² day1,8,15
 シスプラチン(ランダ) 70 mg/m² day2

| | |
|--------|-----------|
| 本管① | Day3 |
| KN3号輸液 | 500mL 1 袋 |
| | |
| | |

アプレピタント80mg 1カプセル内服

| | |
|--------|-----------|
| 本管② | |
| KN3号輸液 | 500mL 1 袋 |
| | |
| | |

| | |
|--------|-----------|
| 本管③ | |
| KN3号輸液 | 500mL 1 袋 |
| | |
| | |

レジメンコメント1

レジメンコメント2

- アプレピタントカプセル
Day2 125mg
(シスプラチン投与開始1~1.5時間前)
- Day3,4 80mg
- デカドロン錠4mg
Day3,4,5 2錠(8mg) 2×/Day

9時間

Day8へ続く

<実施時の注意>

漏出時:直ちに投与を中止し、薬剤を吸引、洗浄し、ステロイドの局注、ステロイドの外用剤で対処する。

●シスプラチン

アルミニウムと反応して沈殿物を形成し、活性が低下するのでアルミニウムを含む医療用器具を用いないこと。
 光により分解するので直射日光を避けること。点滴時間が長時間に及ぶ場合には遮光して投与すること。

<注意すべき副作用>

- 発熱 ●食欲不振、吐き気 ●血管痛、静脈炎 ●口内炎 ●脱毛(頭髪、まつ毛、眉毛など) ●手足のしびれ
- 白血球減少 ●赤血球減少(貧血) ●血小板減少 ●腎機能低下 ●肝機能低下