


■■化学療法投与計画書《GEM+CDDP+S-1療法》■■

| | |
|-----|--|
| 実施日 | |
|-----|--|

| | | | | |
|------|------|------|----------------|-----|
| 患者番号 | 性別 | 身長 | cm | 指示医 |
| カネ氏名 | 生年月日 | 体重 | kg | |
| 患者氏名 | 年齢 | 体表面積 | m ² | |

Rp)ゲムシタビン(ジェムザール) 1000mg/m² day 1 2週毎
 シスプラチン(ランダ) 25mg/m² day 1
 TS-1 ※用量は下記参照 内服 day1(夕)~8(朝)

アプレピタント125mg1カプセル内服(シスプラチン投与開始1~1.5時間前)



●アプレピタントカプセル
 Day1 125mg
 (シスプラチン投与開始1~1.5時間前)
 Day2,3 80mg
 ●デカドロン錠4mg
 Day2,3,4 2錠(8mg) 2×/Day

※TS-1用量: 体表面積に応じて調整
 <1.25m² 80mg/body /日(20mg 4C 2×)
 1.25~1.5m² 100mg/body /日(25mg 4C 2×)

<実施時の注意>
 漏出時:直ちに投与を中止し、薬剤を吸引、洗浄し、ステロイドの局注、ステロイドの外用剤で対処する。
 ●シスプラチン
 アルミニウムを含む医療器具を用いないこと。
 光により分解するので直射日光を避けること。点滴時間が長時間に及ぶ場合には遮光して投与すること。

<注意すべき副作用>
 ●発熱 ●食欲不振、吐き気
 ●血管痛、静脈炎 ●口内炎
 ●脱毛(頭髪、まつ毛、眉毛など)
 ●手足のしびれ ●白血球減少
 ●赤血球減少(貧血) ●血小板減少
 ●腎機能低下 ●肝機能低下
 ●皮疹 ●下痢 ●色素沈着