


■■化学療法投与計画書《GEM+CDDP療法》■■

実施日	
-----	--

患者番号 カネ氏名 患者氏名	性別 生年月日 年齢	身長 体重 体表面積	cm kg m <sup>2</sup>	指示医
----------------------	------------------	------------------	----------------------------	-----

Rp)ゲムシタビン(ジェムザール) 1000mg/m<sup>2</sup> day 1,8 3週毎(2週投与1週休薬)  
 シスプラチン(ランダ) 25mg/m<sup>2</sup> day 1,8

アプレピタント125mg1カプセル内服(シスプラチン投与開始1~1.5時間前)



- アプレピタントカプセル  
 Day1/8 125mg  
 (シスプラチン投与開始1~1.5時間前)  
 Day2,3/9,10 80mg
- デカドロン錠4mg  
 Day2,3,4/9,10,11 2錠(8mg) 2×/Day

Day8へ続く

**<実施時の注意>**  
 漏出時:直ちに投与を中止し、薬剤を吸引、洗浄し、ステロイドの局注、ステロイドの外用剤で対処する。  
 ●シスプラチン  
 アルミニウムを含む医療器具を用いないこと。  
 光により分解するので直射日光を避けること。点滴時間が長時間に及ぶ場合には遮光して投与すること。

**<注意すべき副作用>**

- 発熱 ●食欲不振、吐き気
- 血管痛、静脈炎 ●口内炎
- 脱毛(頭髪、まつ毛、眉毛など)
- 手足のしびれ ●白血球減少
- 赤血球減少(貧血) ●血小板減少
- 腎機能低下 ●肝機能低下