


■■化学療法投与計画書《GEM+CDDP療法》■■

実施日	
-----	--

患者番号	性別	身長	cm	指示医
カナ氏名	生年月日	体重	kg	
患者氏名	年齢	体表面積	m ²	

Rp)ゲムシタビン(ジェムザール) 1000 mg/m² day 1,8 3週毎(2週投与1週休薬)
 シスプラチン(ランダ) 25mg/m² day 1,8

アプレピタント125mg1カプセル内服(シスプラチン投与開始1~1.5時間前)



●アプレピタントカプセル
 Day1/8 125mg
 (シスプラチン投与開始1~1.5時間前)
 Day2,3/9,10 80mg
 ●デカドロン錠4mg
 Day2,3,4/9,10,11 2錠(8mg) 2×/Day

<実施時の注意>
 漏出時:直ちに投与を中止し、薬剤を吸引、洗浄し、ステロイドの局注、ステロイドの外用剤で対処する。
 ●シスプラチン
 アルミニウムを含む医療器具を用いないこと。光により分解するので直射日光を避けること。点滴時間が長時間に及ぶ場合には遮光して投与すること。

<注意すべき副作用>
 ●発熱 ●食欲不振、吐き気
 ●血管痛、静脈炎 ●口内炎
 ●脱毛(頭髪、まつ毛、眉毛など)
 ●手足のしびれ ●白血球減少
 ●赤血球減少(貧血) ●血小板減少
 ●腎機能低下 ●肝機能低下