

患者番号	性別	身長	cm	
カナ氏名	生年月日	体重	kg	指示医
患者氏名	年齢	体表面積	m ²	

Rp)トラスツズマブ(ハーセプチン) 6mg/kg 初回のみ8mg/kg day1のみ
 ビノレルビン(ナベルビン) 25mg/m² 点滴静注 day1,8 3週毎(2週投与1週休)

本管①	Day1
生理食塩液	100mL 1 瓶

終了時50mLフラッシュ

レジメンコメント1
レジメンコメント2

側管①
大塚生食注 250mL 1 袋
トラスツズマブ mg
トラスツズマブBS点滴静注用150mg 150mg:
トラスツズマブBS点滴静注用60mg 60mg:

※初回90分 2回目は60分 3回目以降は30分で投与可

側管②
【50mL】生理食塩液 50mL 1 瓶
ビノレルビン酒石酸塩 mg
ナベルビン注40 40mg4mL:
ナベルビン注10 10mg1mL:

5分

★トラスツズマブ投与期間中、以下の初期症状(Infusion reaction)に注意すること

- ・発熱、悪寒
- ・嘔気、嘔吐
- ・疼痛、頭痛、めまい
- ・咳、発疹、無力症など
- ・アナフィラキシー様症状
- ・間質性肺炎、肺障害

異常が認められた場合には解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤の投与等を行うとともに、症状が回復するまで患者の状態を十分に観察すること

Day8へ続く

<実施時の注意>

漏出時(ビノレルビン):直ちに投与を中止し、薬剤を吸引、洗浄し、ステロイドの局注、ステロイドの外用剤で対処する。
 トラスツズマブ:ブドウ糖溶液との混合を避け、同じ点滴ラインを用いた同時投与は行わないこと。
 ビノレルビン:血管痛、静脈炎を起こすことがあるので、注射部位、注射方法等に十分注意し、投与後は補液等により薬液を十分洗い流すこと。

<注意すべき副作用>

- アレルギー様症状 ●食欲不振、吐き気 ●血管痛、静脈炎 ●口内炎 ●脱毛(頭髪、まつ毛、眉毛など)
- 白血球減少 ●赤血球減少(貧血) ●肝機能低下 ●心機能低下