

実施日	
-----	--

患者番号	性別	身長	cm	
カナ氏名	生年月日	体重	kg	指示医
患者氏名	年齢	体表面積	m <sup>2</sup>	

Rp) パクリタキセルアルブミン懸濁型 (アブラキサン) 260mg/m<sup>2</sup> day1 3週毎

本管①	Day1
生理食塩液	100mL 1 瓶

レジメンコメント1
レジメンコメント2

側管①	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)1瓶あたり生理食塩液20mLで溶解
30分	【mL】生理食塩液 100mL mL
	パクリタキセル(アルブミン懸濁型) mg
	アブラキサン点滴静注用100mg:

★内服 末梢神経障害対策  
 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 3包 3x  
 メチコバル錠500μg 3錠 3x

投与液量: mL

※終了時生理食塩液50mLフラッシュ

＜実施時の注意＞

漏出時:直ちに投与を中止し、薬剤を吸引、洗浄し、ステロイドの局注、ステロイドの外用剤で対処する。  
 インラインフィルターは使用しないこと。  
 特定生物由来製品に該当するため、医薬品名(販売名)、その製造番号又は製造記号(ロット番号)、使用年月日、使用した患者の氏名、住所等を記録し、少なくとも20年間保存すること。

＜用量規制因子＞

投与前に好中球数1500/mm<sup>3</sup>未満又は血小板数が10万/mm<sup>3</sup>未満であれば骨髓機能が回復するまでは投与を延期すること。投与後、好中球数数が7日間以上にわたって500/mm<sup>3</sup>未満となった場合、血小板数が5万/mm<sup>3</sup>未満になった場合、発熱性好中球減少症が発現した場合、次コースの投与量を減量すること。Grade3以上の末梢神経障害が発現した場合には、軽快又は回復(Grade1以下)するまで投与を延期し、次回の投与量を減量して投与すること。

＜注意すべき副作用＞

●食欲不振、吐き気 ●筋肉痛、関節痛 ●手足のしびれ ●脱毛(頭髪、まつ毛、眉毛など) ●白血球減少  
 ●赤血球減少(貧血) ●血小板減少 ●脳神経麻痺 ●間質性肺炎 ●黄斑浮腫