

化学療法投与計画書《Pan療法》

| | |
|-----|--|
| 実施日 | |
|-----|--|

| | | | | |
|------|------|------|----------------|-----|
| 患者番号 | 性別 | 身長 | cm | 指示医 |
| カナ氏名 | 生年月日 | 体重 | kg | |
| 患者氏名 | 年齢 | 体表面積 | m ² | |

Rp)パニツムマブ(ベクティビックス) 6 mg/kg day1 2週毎

| |
|---------------------------|
| 本管① |
| 生理食塩液 100mL 1 瓶 |
| |
| |

| |
|-----------|
| レジメンコメント1 |
| |
| レジメンコメント2 |
| |

| | | |
|------------|--------------------|----|
| 側管① | 全量100mLに調製 | |
| 60分 | 【mL】生理食塩液 100mL | mL |
| | パニツムマブ | mg |
| | ベクティビックス点滴静注400mg: | |
| | ベクティビックス点滴静注100mg: | |
| | | |
| | | |

※終了後1時間は経過観察(バイタルサインをモニターする等)を行うこと

★パニツムマブ投与期間中、以下の初期症状(Infusion reaction)に注意すること (※症状発現時→重症度に応じて速やかに対処)

- ・意識消失又はショックを症状としたアナフィラキシー様症状
- ・呼吸困難・気管支痙攣
- ・蕁麻疹
- ・低血圧
- ・悪寒・発熱
- ・血管浮腫 等

★パニツムマブ投与に伴う皮膚障害対策

〈予防〉・・・初回投与時より開始

- ①ミノマイシンカプセル 200mg 2× (投与6週間で終了)
- ②ヘパリン類似物質(保湿剤:体全体に塗布)

〈症状発現時〉

- ③ロコイド軟膏orクリーム(ステロイド剤/Medium:顔)
- ④アンテベート軟膏(ステロイド剤/Very Strong:体)

※以後、症状により継続・再開及び抗アレルギー剤等薬剤追加検討

※上記無効時又は外用ステロイド副作用発現時

＜実施時の注意＞

インラインフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を用いて投与すること。

＜用量規制因子＞

重度(Grade3以上)のInfusion reaction: 投与中止し以降再投与しないこと

Grade2以下のInfusion reaction: 投与速度を減じて慎重に投与すること

重度(Grade3以上)の皮膚障害発現時は投与延期

→投与延期後6週間以内にGrade2以下に回復(6mg/kg又は4.8mg/kg)

＜注意すべき副作用＞

●皮膚科症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)