

■■ 化学療法投与計画書《CBDCA+GEM療法》■■

実施日	
-----	--

患者番号	性別	身長	cm	指示医
カナ氏名	生年月日	体重	kg	
患者氏名	年齢	体表面積	m ²	

Rp) カルボプラチン(パラプラチン) AUC = 5/body day1
 ゲムシタビン(ジェムザール) 800 mg/m² day1,8,15 4週毎

本管①	Day15		
↓ 1 5	アロキシン点滴静注バッグ	1	袋
	0.75mg 50mL		
	デカドロン注射液1.65mg 0.5mL	2	管

レジメンコメント1
レジメンコメント2

本管②	Day15		
↓ 3 0	大塚糖液5% 250mL	1	袋
	ゲムシタビン塩酸塩		mg
	ゲムシタビン点滴静注液1g		
	ゲムシタビン点滴静注液200mg		

参考
 カルボプラチン投与量(mg/body)
 =5(AUC)×〔 〕 (GFR又は

<実施時の注意>

漏出時:直ちに中止し、薬剤を吸引、洗浄し、ステロイドの局注、ステロイドの外用剤で対処する。
 カルボプラチン:アルミニウムと反応して沈殿物を形成し、活性が低下するので、アルミニウムを含む医療器具を用い

<注意すべき副作用>

- 発熱 ●食欲不振、吐き気 ●血管痛、静脈炎 ●口内炎 ●脱毛(頭髪、まつ毛、眉毛など) ●白血球減少
- 赤血球減少(貧血) ●血小板減少 ●肝機能低下