

■■化学療法投与計画書《S-1+CDDP療法》■■

実施日	
-----	--

患者番号	性別	身長	cm	
カナ氏名	生年月日	体重	kg	指示医
患者氏名	年齢	体表面積	m ²	

Rp)シスプラチン(ランダ) 60 mg/m² Day8 5週毎(3週投与2週休薬)
 TS-1 ※用量は下記参照 内服 Day1~21

KN3号500mL×3袋 9時間かけて

本管①	Day9
KN3号輸液	500mL 1 袋

本管②	
KN3号輸液	500mL 1 袋

本管③	
KN3号輸液	500mL 1 袋

レジメンコメント1
レジメンコメント2

※TS-1用量: 体表面積に応じて調整
 <1.25m² 80mg/body /日 (20mg 4C 2×)
 1.25~1.5m² 100mg/body /日 (25mg 4C 2×)
 1.5m²< 120mg/body /日 (20mg 6C 2×)

●アプレピタントカプセル
 Day8 125mg (シスプラチン投与開始1~1.5時間前)
 Day9,10 80mg
 ●デカドロン錠4mg
 Day9,10,11 2錠(8mg) 2×/day

<実施時の注意>

漏出時:直ちに投与を中止し、薬剤を吸引、洗浄し、ステロイドの局注、ステロイドの外用剤で対処する。
 アルミニウムを含む医療器具を用いないこと。
 光により分解するので直射日光を避けること。点滴時間が長時間に及ぶ場合には遮光して投与すること。
 投与当日は1日3000mL以上の尿量を確保。投与後3日間は1日1500mL以上の尿量を確保することが望ましい。

<注意すべき副作用>

- 食欲不振、吐き気 ●皮疹 ●下痢 ●口内炎 ●色素沈着 ●手足のしびれ
- 脱毛(頭髪、まつ毛、眉毛など) ●白血球減少 ●赤血球減少(貧血) ●血小板減少
- 腎機能低下 ●肝機能低下