

実施日	
-----	--

患者番号	性別	身長	cm	
カナ氏名	生年月日	体重	kg	指示医
患者氏名	年齢	体表面積	m ²	

Rp) カルボプラチン(パラプラチン) AUC=5/body day1 3週毎
 エトポシド(ラステット) 100mg/m² day1,2,3

本管①	Day1
生理食塩液	100mL 1 瓶

レジメンコメント1
レジメンコメント2

側管①	30分	パロノセトロン点滴静注	1	袋
		バッグ0.75		
		アロカリス点滴静注235	1	瓶
		デカドロン注射液1.65m	3	管

側管②	120分	大塚糖液5% 500mL(5%TZ)	1	袋
		エトポシド		mg
		〈腫〉ラステット注100mg/5mL		

側管③	60分	大塚生食注 250mL	1	袋
		カルボプラチン		mg
		〈腫〉パラプラチン注射液450mg		
		〈腫〉パラプラチン注射液150mg		

※参考
 カルボプラチン投与量(mg/body)
 =5(AUC) × ([](GFR又はCcr)+25)

Day2へ続く

<実施時の注意>

漏出時:直ちに投与を中止し、薬剤を吸引、洗浄し、ステロイドの局注、ステロイドの外用剤で対処する。

●カルボプラチン

アルミニウムと反応して沈殿物を形成し、活性が低下するのでアルミニウムを含む医療器具を用いないこと。本剤の投与回数を重ねるとショック、アナフィラキシーの発現頻度が高くなる傾向がある。

光及び熱により分解するので、直射日光や高温を避けること。

ポリカーボネート製の三方活栓や延長チューブ等を使用した場合、そのコネクタ一部分にひび割れが発生し、血液及び薬液漏れ、空気混入等の可能性があるので注意すること。

●エトポシド DEHPを含むポリ塩化ビニル製の点滴セット、カテーテル等の使用を避けること。

<注意すべき副作用>

- 食欲不振、吐き気 ●口内炎 ●脱毛(頭髪、まつ毛、眉毛など) ●白血球減少 ●赤血球減少(貧血)
- 血小板減少