


実施日	
-----	--

患者番号 カナ氏名 患者氏名	性別 生年月日 年齢	身長 体重 体表面積	cm kg m ²	指示医
----------------------	------------------	------------------	----------------------------	-----

Rp)イミフィンジ 1500mg/body day1
 ゲムシタビン(ジェムザール) 1000mg/m² day 1,8
 シスプラチン(ランダ) 25mg/m² day 1,8 3週毎(2週投与1週休薬)



レジメンコメント1
レジメンコメント2

Day2、3 Day8、9
 デカドロン錠4mg 2錠(8mg) 2× 2日間内服

- <注意すべき副作用>**
- 発熱 ●食欲不振、吐き気
 - 血管痛、静脈炎 ●口内炎
 - 脱毛(頭髪、まつ毛、眉毛など)
 - 手足のしびれ ●白血球減少
 - 赤血球減少(貧血) ●血小板減少
 - 腎機能低下 ●肝機能低下
 - 間質性肺疾患 ●内分泌障害 ●大腸炎
 - 皮膚障害

<実施時の注意>

漏出時:直ちに投与を中止し、薬剤を吸引、洗浄し、ステロイドの局注、ステロイドの外用剤で対処する。

- デュルバルマブ
 0.2又は0.22µmインラインフィルター(ポリエーテルスルホン製等)を使用して点滴静注すること。希釈後デュルバルマブの最終濃度が1~15mg/mL以上となるように調製する。体重が30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kgとする。
- シスプラチン
 アルミニウムを含む医療器具を用いないこと。光により分解するので直射日光を避けること。点滴時間が長時間に及ぶ場合には遮光して投与すること。

Day8へ続く